



SOINS EN CAS DE PROJECTION DE CYTOSTATIQUE SUR PEAU SAINTE

OBJET : Description de la conduite à tenir en cas de projection d'anticancéreux sur une peau saine

PERSONNES CONCERNEES : Préparateurs en pharmacie et IDE des services d'hospitalisation et d'hôpital de jour

METHODE

- ✓ Toutes les mesures à prendre en cas de diffusion accidentelle d'un cytostatique ont pour but de protéger les personnes dans un premier temps puis l'environnement.
- ✓ En cas de dispersion d'un médicament dans l'environnement, il est nécessaire d'éliminer tout risque d'inhalation et contact direct.

ENVIRONNEMENT

- Interdire l'accès de la pièce : panneau « accès interdit » à poser.
- Faire sortir le personnel présent, 1 ou 2 intervenants doivent rester.
- Porter des gants, lunettes et blouse à manches longues.
- Nettoyer la zone contaminée selon protocole...

POUR LA PERSONNE CONCERNEE

- ☀ Enlever avec précaution les vêtements contaminés et les gants
- ☀ Faire couler de l'eau fraîche pendant **quinze minutes** sur la peau contaminée
- ☀ Laver avec un savon doux
- ☀ En cas de sensation de brûlure, appliquer une pommade adoucissante non pénétrante type Bepanthène, Dexpanthénol
- ☀ S'il y a une plaie, la considérer comme une extravasation possible
- ☀ Rincer abondamment, ne pas utiliser de désinfectant
- ☀ Décontaminer les vêtements ou les incinérer si contamination trop étendue
- ☀ Remplir une fiche d'évènement indésirable et déclarer l'accident au chef de service
- ☀ Déclarer l'accident à la médecine du travail si nécessaire. Consultation médicale si nécessaire.

REDACTION	VERIFICATION	APPROBATION
Nom(s) & Fonction(s) Brigitte CHANET, pharmacien assistant Valérie TOURRES, préparatrice en pharmacie	Nom : Nadine PLUJA-JEAN Fonction : Pharmacien assistant Date : 06.07.2004	Nom : Françoise BLANC-LEGIER Fonction : Pharmacien gérant Date : 07.07.2004
Date : 09.10.2003		